



حكومة فلسطين

دائرة الزراعة ومصائد الاسماك

الاحاديث الزراعية المذاعة على المزارعين خلال شهر ايلول سنة ١٩٣٧

(ما عدا تلك المنشورة في الملحق الزراعي)

الصفحة

٣	تكملة حديث البذور وفحصها
٨	قطف أثمار الحمضيات وتعبئتها للتصدير
١١	تربية الطيور الداجنة خلال فصل الخريف
١٦	مباحثة بين المستشار المتجول لمصلحة وقاية النبات ومزارع خضار

الثلاثاء ٧ أيلول سنة ١٩٣٧

حديث زراعي

تكملة حديث البذور وفحصها

تحدثنا اليكم في حديثنا السابق عن هذا الموضوع عن الالوجه العامة لفحص البذور وفائدة الفلاح في مثل هذا العمل الهام وكيف يمكنه ان يوفر على نفسه خسارة عظيمة جدا .

وقد أشرنا أيضا عن أهمية عمر البذور وثقلها ورأيتها وقوتها الانباتية.

ونبحث الآن في الامور التالية مثل العلاقة بين صفة البذور وكميتها في الدونم والعناية بالاشتال وقيمة معرفة المصدر الحقيقي للبذور والملاحظات عن حيويتها ونقاوتها والتلميحات العامة أيضا عن الشراء

العلاقة بين صفة البذور والكمية التي ينبغي أن تبذر منها في الدونم

ربما يتحقق بعض الزراع المقدار الهام لزراعة الكمية المناسبة للبذور. وقد يسأل الكثيرون «ما هي الكمية المناسبة؟» فالجواب هو أن مقدار البذور المناسبة يتوقف على أشياء متعددة ومن أهم هذه الأشياء جودة صنف البذور المراد زرعها. وتشير التعليمات عادة عن كميات البذور الى صفتها الجيدة فتزاد الكمية اذا لم تكن البذور ممتازة الصنف. اذ أنه اذا زرعت الكمية العادية في الدونم من بذور رديئة تكون نباتات المحصول ضعيفة ورفيعة

وللمثال على ذلك لنأخذ حقلا من الجزر فاذا زرع فيه بذور جيدة ينبغي أن ينبت ٨٥ ٪ منها ولكنه ينذر جدا أن يتمكن المزارعون من الحصول على بذور تنبت بهذه الجودة ويحتمل كثيرا أن يكون الانبات سبعين في المائة. ولنفرض أنه لم ينبت الا أربعون في المائة من البذور لهذا اذا لم يزرع ضعف الكمية العادية فلا يحصل الا على نحو نصف الناتج

فيتضح لكل انسان أن اختبار البذور يكون في الحقيقة ضروريا في أية حالة للتمكن من معرفة مقدار الحب الذي يلزم أن يزرع على الكمية المعتادة ويكون ذلك ضروريا

ليعوض عن تلك البذور التي لا تنبت أبدا. وقد نظم الرقم القياسي لكميات البذور اللازمة للدونم على أساس البذور الممتازة الصنف ومما يستحق الاعتبار كثيرا هو أن يقدر الزراع حينما يجتبرون انبات بذورهم المقدار الذي يزرع زيادة على الكمية المعتاد بذورها

ومن المهم أن يعرف جميع ذلك قبل أن يبذر الحب لانه ليس في الامكان التعويض عن النقص في الانبات الذي ظهر بالفحص حينما يكون الحقل مزروعا

قيمة البذر الحقيقية

يستطيع المشتري ببذل جهد قليل في تقدير القيمة الحقيقية لكل نموذج من البذور أن يستفيد فائدة كبرى

واليكم النقاط الرئيسية التي تتوقف عليها قيمة البذر :—

- (١) صفاء البذر أو نقاوته
- (٢) مكان مصدره
- (٣) حالته. ويعنى بذلك (١) النظافة (٢) الحيوية

لنبحث عن الشرط الاول :— نعنى بصفاء البذر أى أنه ينتج عن سلالة معلومة. ومن الممكن عادة أن يعرف بمجرد النظر ، الجنس الخاص لكل بذر مثل الفصّة والملفوف واللفت الخ. ولكنه ليس في الامكان غالبا أن يميز نوع الفصّة أو الملفوف أو غير ذلك اذ قد لا يعرف النوع نفسه. ولا يمكن أن تميز النماذج الشديدة الانتساب الى بعضها بصورة قاطعة ما لم تصبح الاشتال كبيرة وفي الواقع يكون من المسلم به أن شراء نوع البذور المطلوب يتوقف على صدق قول البائع ويرى هنا مقدار أهمية الحصول على جميع البذر من بائع بذور موثوق به

ويعرف معظم الزراع جميع بذور المحاصيل العادية بالنظر اليها ولكن في حالة بذور الاعشاب وأنواع البرسيم والاصناف الغير عادية تحسن استشارة خبير بذلك للتحقق من نوع هذه البذور

الشرط الثانى وهو مكان مصدر البذر

اذا لاحظنا قليلا نرى أن هذه المسألة لا تقل أهمية عن غيرها. اذ من الشائع أن بعض المناطق تنتج محاصيل تكون صفتها أجود من الأخرى. وأنه لا يوجد منطقتان تنتجان نفس الأنواع وخصوصا عند اختلاف الأحوال الجوية أى أن بعض الأنواع يوجد في بعض المناطق أكثر من الأخرى.

ولهذا من المهم جدا أن يعرف كل مزارع أى نوع من أنواع المحاصيل المختلفة يكون أكثر ملائمة لمنطقته الخاصة وأحوالها العامة. وذلك حينما تحقق أهمية المنطقة التى صدرت عنها البذور. وقد ينمو البذر في أحوال تجعله غير مناسب تماما لاجل المشتري فيجدر به أن يعرف على الأقل جميع التفاصيل الضرورية المتعلقة بإنتاجه.

أما بأتعوا البذور الطيبون فيشجعون المشتريين على تنظيم أحوالهم المحلية بصورة يتمكنون فيها من تجهيز لوازمهم كما يجب ولهذا على المشتريين أن يكونوا منتبهين فيعنوا بهذه النقطة حين الشراء.

وبهذه المناسبة ان مسألة الحصول على بذور متعودة على هواء البلاد هى ذات أهمية أساسية. وقد حصل على نتائج جيدة من البذور التى زرعت في منطقة شبيهة في أحوال اقليمها العامة بتلك التى يزرع هذا البذر فيها وتستعمل هذه المسألة الى درجة عظيمة في الزراعة خاصة. وفي مثل هذه الحالات تصادف أحواض البذور والنباتات نفس العناية التى قد تبذل مثلا لحديقة الأزهار حيث تستعمل البذور الاجنبية بصورة واسعة

ومكان مصدر البذر هام أيضا من وجهة الامراض فينبغى السعى بقدر الامكان للحصول على بذور من مناطق خالية من الامراض ففي حالة الحبوب مثلا أن تكون خالية من السواد (أى الطابون) والصدأ (أى الحمرة) أو الآفات الأخرى. وبهذه الطريقة فمن المرجح أن تحفظ المنطقة المحلية سليمة

الشرط الثالث (١) النقاوة أو النظافة

يقتضى أن يكون جميع البذر خاليا تماما من بذور الاعشاب البرية والاوزاخ الاخرى غير أن البذر الصغير يحتوى في أغلب الأحيان على نسبة قليلة من البذور الغريبة. وليس في الامكان فصل بعض بذور الاعشاب البرية الصغيرة من بذور المراعى والبرسيم ويجب أن يعمل بعض التنزيلات ولكن اذا فحص البذر وظهر أن نسبة عدم النقاوة فيه تزيد على ثلاثة في المائة فيجب أن لا يشترى مهما كانت الاحوال.

واذا عرف أن بعض بذور الاعشاب البرية موجود في نماذج البرسيم أو الفصة وذلك مثل بذور النباتات الطفيلي وهو الكشوئا (ويسمى حامول) فيجب أن لا يشترى أبدا لانه من الممكن فصل هذه الاشياء الغريبة من البذور. ويجدر بالمشتري أن يحصلوا على كفالة تضمن أن البذر خال من هذه الآفة

ولا ينتظر أن يكون البذر الرخيص جيدا أو نظيفا بقدر الآخر الثمين والبذر الغالى قد ثبت على طول المدى أنه رخيص (وذلك لان الشروط الزراعية اللازمة متوفرة فيه فينتج محصولا أوفر) ولهذا فالنصيحة هي «ادفع سعرا مناسباً وخذ مادة جيدة». وفي حالة البذور التي لا تشترى رأسا من بائعيها بل يحصل عليها من المزرعة أو تستبدل محليا فالغريبة تنظفها دائما من كثير من البذور الغير مرغوب فيها وفي هذه الحالات يفيد كثيرا غربال الاصطفاء غير أن معظم الزراع لا يملكون الآلات الضرورية لاجل تنظيف البذور تنظيفا جيدا ولهذا فأحسن البذر وأنظفه لا يحصل عليه الا من التاجر الذي يملك مثل هذا الجهاز

(٢) الحيوية

وتعنى هذه نسبة البذور المئوية التي تنبت فعلا في نموذج ما تحت شروط مناسبة. ولجل أن تعين نسبة الانبات المئوية انتخب نموذجا من كومة بذر وذلك بأخذ قليل من الرأس والوسط والقعر من كيس واحد ثم من كل كيس آخر هذا اذا كان مجموع الاكياس أكثر من اثنين أو ثلاثة. ثم اخلط تماما هذه الكميات الصغيرة وخذ منها مقدارا معينا يكفي ليغطي

قعر صحن متوسط الحجم ولتكن سعة خمسة وعشرين سنتمرا ثم أبسط ذلك في الصحن بصورة أن تتمكن من فصل جميع الأشياء الغريبة بواسطة سكين أو ملعقة. وينبغي أن توزن هذه الأوساخ ثم تحسب النسبة المئوية للمجموع

وحينما تفحص البذور توضع بين ورق نشاف أو مادة أخرى ماصة التي ينبغي أن تحفظ مرطبة بالماء وفي درجة حرارة تتراوح ما بين خمس وعشرين وثلاثين سنتغراد وتترك البذور مدة كافية حتى تنبت وعندئذ يمكن أن تعد البذور التي نجت في الانبات تماما وتحسب كنسبة مئوية للمجموع.

وبالنتيجة ينبغي دائما أن تلاحظ النقاط التالية لكي تضمن اجتناب البذور الغير مناسبة

(١) اشتر من بائعي البذور الموثوق بهم واحصل على نماذج من البذور وافحصها قبل الشراء. أما الضمانات بخصوص نسبة الانبات المئوية والنقاوة فهي ذات قيمة لا يستهان بها

(٢) تجنب البذور الرخيصة وهناك محلات بذور تجارية تزود الزراع ببذور جيدة الصنف يعول عليها وذلك بأسعار مناسبة

(٣) حينما تطلب البذور اجث عن مكان مصدرها واذكر في الطلب دائما خصائص الاحوال المحلية للتربة والطقس الخ. أما مكان مصدر البذور فهام من وجهة الامراض كما سلف ذكره ، والبذور الاجنبية تحتوى غالبا على كثير من بذور الاعشاب البرية

(٤) لا تهمل أبدا القيام بفحص البذور في البيت لكي تجرب شخصا جميع البذور المستعملة

الثلاثاء في ١٤ أيلول سنة ١٩٣٧

حديث زراعى

قطف أثمار الحمضيات وتعبئتها للتصدير

ان موسم الحمضيات الآن يشغل مرة أخرى بال كثيرين من أصحاب البيارات في هذه البلاد ، ومما يستحق الاعتبار مرة أخرى ، هى الحاجة الماسة للاسلوب المناسب والعناية في قطف الاثمار وتعبئتها ، لكى يضمن وصولها الى الاسواق الخارجية وهى في حالة جيدة . وقد ينتج تلف الثمار أو تعفنها عن أسباب كثيرة ، أهمها عدم نضج الثمر والاعوية الوسخة والتعبئة الرديئة . وأى سبب من هذه الاسباب أو جميعها قد تسبب خسائر عظيمة لأصحاب البيارات والشاحنين ، وربما تضع سدى الجهود والدراهم التى أنفقت فى البيرة خلال الاشهر السابقة وقد لا يكون الضرر الحاصل للامثار ظاهرا في حينه ويمكن أن لا يكون واضحاً أيضاً قبل الشحن لان عدوى التعفن تحتاج لثموا بضعة أيام . ولهذا فكثيرون يفشلون في معرفة الضرر الذى قد أوجدوه بجمع الاثمار الغير ملائمة أثناء القطف واللف والنقل وكذلك استعمال الصناديق أو السلال الوسخة والاعوية المصنوعة بصورة سيئة . غير أنه من السهل على صاحب البيرة أو الشاحن أن يتأكد من الحالة التى يحتمل أن تكون فيها أثماره حين وصولها السوق ، وذلك بحفظ عدة صناديق من كل (ارسالية) تحت ظروف مشابهة بقدر الامكان لتلك التى تكون فيها الارسالية في طريقها الى السوق . فيتمكن حينئذ من الحصول على بعض فكرة فيما لو سببت أى ضرر المعاملة التى عوملت بها الثمار قبل شحنها . وينبغى أن لا ينسى أن قشرة البرتقالة تحتوى على مئات من الجيرات الزيتية الرخوة كثيرا والتي تتفجر بسهولة حالا بعد القطف وخصوصا حينما يلى هذه العملية مطر غزير

وقبل بدأ الموسم يجب على كل مصدر أن يتحقق من نظافة صناديق حقله وسلال القطف والمقصات وأن تكون بنظام تام وأن يجهز بيتا لللف والتعبئة جيد التهوية لحزن ثماره وتهيئتها للشحن . وينبغى أن تفحص صناديق الحقل لرؤية سطحها الداخلى ليكون أملس وخاليا من المسامير البارزة . ويلزم أن يكون لهذه الصناديق موضع لتجديد الهواء بين الاواخر والجوانب وينصح أن تكون مقسمة الى قسمين بينهما فضاء لزيادة تجديد الهواء . ومن

الضرورى أن يكون في رؤوس الصناديق قطعة خشبية للتقوية بها أو نتؤ موجود في كل طرف من أطرافها لآخذ وزن صناديق الثمار الموضوعة فوق بعضها حينما تكون مصفوفة في داخل بيت التعبئة . ومما يجعل الصندوق قويا جدا ويضمن له بقاء طويلا هو السلك المشدود به والمسمر على القطع الخشبية وحول طرف الصندوق

والطريقة الشائعة في فلسطين هى استعمال سلال تجمع فيها الاثمار وتفرغ هذه السلال في بيت التعبئة حيث تكوم الثمار في أكوام . وهذه الطريقة لا تساعد على تجديد الهواء الكافي لجميع الثمار واذا كانت الاكوام عالية يحصل ضغط كبير جدا على الاثمار السفلية

وصندوق الحقل مناسب لحزن الاثمار في بيت التعبئة خلال وقت ذبولها على أن يكون مصنوعا بحيث يساعد على تجديد الهواء لما يحتويه بدون ضغط زائد. وفي الحقيقة أن نفقة رأس المال لصناديق الحقل أعظم منها للسلال ولكن ذلك يحسن المحصول ، ونتيجة استعمال الصناديق تفوق حتما ما يعادل زيادة النفقة

ويجب أن لا تقطف الاثمار وهى رطبة وأن يتجنب هذا بقدر الامكان لان حجيرات القشر تكون منتفخة حينئذ وفي هذه الحالة تكون أكثر عرضة للضرر . وحينما يكون القطف بعد المطر لا بد منه فمن الامور الاساسية وجوب استعمال العناية العظيمة في جميع الاعمال وأن تكون الصناديق جيدة التهوية حيث ينبغي أن توضع الاثمار فيها لتذبل

ويقتضى أن تقطف كل ثمرة باعثناء مع الاهتمام بعدم خدش القشر أثناء العمل بالمقص أو بالاعصان اليابسة على الشجرة أو بأظافر العامل الذى يحنى الثمر اذا لم يكن يلبس (كفوفاً). ويجب قص عنق الثمرة قصا مربعا وقريبا منها بقدر الامكان بدون تعريض القشر للضرر

تستعمل أكياس للقطف في معظم البلدان وهذه يحملها العمال الذين يقطفون الثمر وتفرغ الاكياس في صناديق الحقل بفتحة في قعرها وهذه الطريقة تنتج أقل مقدار من الضرر . واذا لم تستعمل أكياس القطف فينبغى وضع الثمر رأسا وباعثناء في صناديق أو في سلال نظيفة ويقتضى أن لا تكوم الصناديق أبدا على التراب بل يلزم أن توضع على ألواح خشبية لاجتناب دخول الرمل أو الطين اليها ولمنع الرطوبة من الوصول الى الصناديق

السفلية . ويجب أن لاتوضع الاثمار المتضررة أبدا في وعاء القطف بل بالاحرى يلزم رميها على الارض فتلتقط فيما بعد . ويلزم أن لاتملا الصناديق الى ما فوق سطح القطع الخشبية لان ذلك يعرض الاثمار في رأس كل صندوق للتلف برضا حينما تصف الصناديق فوق بعضها . ويجب جمع الثمار المتضررة أو المتعفنة أو الساقطة بسبب ما ذكر بانتظام واتلافها أو طمرها وكذلك ينبغي نزع الثمار المتعفنة والمعلقة على الاشجار وحرقتها أو طمرها قبل قطف المحصول

ومن المعلوم أن جميع الثمر على الشجرة لا يكون جاهزا للقطف في نفس الوقت . فيلزم أن تكون القطفة الاولى للثمار الناضجة فقط ويجرى القطف الحقيقي حينما يصبح المحصول بحالة النضج المناسب .

وعلى أولئك الذين تنقل أثمارهم في سلال من البيارة الى بيت التعبئة للخرن في أكوام أن يلاحظوا العمال ليفرغوا الثمر على الكومات باعتناء زائد وأن لا يزيد عمقها في أية نقطة على أربعين سنتمترا .

واذا استعملت عجلات النقل فيجب أن تكون جيدة الصنع لتجنب الاهتزاز الزائد للثمار . وتجهيز عجلة النقل باطار عجلة سيارة يقلل ارتجاج الثمر كثيرا وجرها ببطء وهدوء يساعد الحيوانات على سحب أثقال كبيرة . ويجب أن تعبأ الصناديق باعتناء وتصف على عجلات النقل وتنقل باعتناء أيضا الى بيت اللف . ويقتضى أن لا تباح للعمال التعبئة بجشونة لان ذلك يضر الثمار في الصناديق

واذا استعمل النقل بسكة حديد في البيارة فيلزم الاهتمام لنقل الثمار على الخط بهدوء لاجتناب الاهتزاز الزائد في عجلات النقل .

قد حاولنا في هذا الحديث أن نوكد أهمية اتخاذ الحرص العظيم في جميع درجات جمع محصول الحمضيات وتعبئته من البيارة الى بيت اللف والتعبئة لاجتناب ضرر الثمار الذي ينتج لها التعفن قبل أن تصل الى السوق . وقد سبب هذا التعفن فيما مضى خسائر فادحة لاصحاب البيارات الذين ينصحون لمنافعهم الخاصة أن يحسنوا أساليبهم للتعبئة حسب الارشادات السالفة الذكر .

الثلاثاء ٢١ أيلول سنة ١٩٣٧

حديث زراعى

تربية الطيور الداجنة خلال فصل الخريف

تبدأ سنة تربية الطيور الداجنة في تشرين الاول ولهذا ففصل الخريف هام جدا لمربي الطيور الداجنة. وتستلزم التدابير تبصرا كثيرا لهذا الموسم من السنة ، فينبغى أن يبكر في القيام بها ، أما المراقبة الشديدة والتربية الجيدة فضرورتان خلال هذا الدور ، ويقتضى أن تتخذ الخطط بصورة مبكرة للتوسع في الاعمال خلال السنة الجديدة ولشغل الموسم الجارى وذلك لتجنب الاهمال والمصادفة ، لان الترتيبات المتأخرة قد تسبب تأخيرا في العمل ويكون لها التأثير المضر على تقدم المزرعة ونموها.

وينصح مربوا الطيور الداجنة أن يحسبوا الربح والخسارة للسنة الماضية لكي يستطيعوا أن يكتشفوا أية خسارة يمكن اجتنابها ويتخذوا الاحتياطات الضرورية لاصلاحها في أعمال السنة الجديدة. ونلفت نظر أولئك الزراع الذين لا يحفظون حسابات كما يجب أن طريقة الحساب الجيدة لا غنى عنها وهى ضرورية لهذا الفرع كضرورتها لاي مشروع آخر.

ينبغى أن تنقل الفراخ الى بيوت وضع البيض الدائمة قبل أن تبدأ في وضع البيض بأسبوعين على الأقل. وهذه المدة تكون كافية لتصبح الفراخ متعوده على بيوتها الجديدة ويتجنب سقوط الريش الفجائى الذى قد ينتج بنقلها بعد ما تبدأ في وضع البيض.

ويحسن أن يزود بيت وضع البيض بأوكار (أى مباض) لتبيض فيها الفراخ لان وضع البيض على الارض أو على القش قد يسبب له خسارة وضررا. والدجاجات التى تبيض على الارض يلزم أن تمسك وتوضع في مكان وضع البيض. ويجب أن ينقل البيض الموضوع على الارض وخصوصا المكسور منه بدون تأخير لان ذلك يشجع الدجاج على أكله وهى عادة رديئة يصعب جدا التغلب عليها.

ويقضى أن ينتخب نسل كمية الدجاج ويلقح ، وأن تنتخب الفراخ البيضاء باعتناء أما الأخرى التي لا يرجى منها ، فتسمن جميعها وتباع. ويمكن أن تنبذ أيضا مجموعة الفراخ ذات الانسال الخفيفة التي لم تبدأ بوضع البيض في سن الستة أشهر ويعنى بالانسال الخفيفة مثل الدجاج البلدى واللكهرون. (وتنبذ أيضا الانسال الثقيلة التي لم تبدأ في وضع البيض في سن الثمانية أشهر) (يعنى بالثقيلة أى الكبيرة الحجم مثل الرود آيلاند الاحمر أو الدجاج الاسمر الكبير). وكذلك الدجاجات السمينه الكبيرة في العمر التي قد أمت نسل ريشها قبل تشرين الاول والتي لا تكون بياضة جيدة. وتمتاز الدجاجة البيضاء بالصفات التالية :— أن تكون ذات مخرج رطب (والمخرج هو ثقبها الذي تضع منه البيضة) وحوض واسع (أى أن عظمى حوضها واسعا الانتشار) وأن يكون عظم صدرها متجها الى أسفل والمسافة بينه وبين عظمى الحوض بمقدار اصبعين أو ثلاثة. والمميزات السالفة الذكر لا تكون ظاهرة في الدجاجات التي قد توقفت عن وضع البيض. وإذا كانت المسافة بين عظم الصدر وعظمى حوض الدجاجة أقل من اصبعين تتوقف الدجاجة عن وضع البيض.

وينصح أن تزداد أجزاء الخلوطة الغنية في الزلال (مثل مسحوق اللحم ومسحوق السمك) لغاية اثني عشر قسما في المائة للدجاج والفراخ في حالة وضع البيض التام. ويجب أن تطعم مجموعة الدجاج بكميات كافية طعاما أخضر جديدا وغضا وإذا لم يتيسر ذلك فيجب أن يضاف الى الخلوطة بنسبة واحد أو اثنين من زيت السمك ذى الصفة الجيدة الموثوق بها أما بيوت الطيور الداجنة فيجب اجراء الكشف عليها فتعمل جميع التصليحات الضرورية وترمم مواضع ارتشاح السقف (أى مواضع الدلف) وتبدل براويز الشباك المكسورة بأسرع ما يمكن. وليكن بيت الطيور الداجنة محكم الاغلاق لاجل فصل البرد القريب ولكن بشرط ان يتجدد الهواء فيه بصورة كافية . اذ ان قلة تجديد الهواء تكون أشد خطرا على الطيور الداجنة من الطقس البارد. ويجب أن لا يحصل مجارى هواء في البيت. ويجب أن لا يكون الدجاج محتشدا على المجاثم وأن يزود بيت الدجاج بمجثم واسع.

ويلزم أن تفحص جميع أدوات حاضنة الفراخ وآلة التفقيس باعتناء وتجرب وتنظف وتصلح في الوقت المناسب ليضمن أن كل شئ يكون جاهزا لاجل موسم التفقيس والتفريخ

القرييين. وينبغي أن ترسل الطلبات في الحال لاستحضار الاقسام الزائدة لحين الحاجة والمفقودة لآلات التفقيس وحاضنات الفراخ لانه يفضل أن تكون الادوات جاهزة قبل الميعاد بشهر واحد على أن تكون متأخرة يوما واحدا.

ومن الضروري أن تعزق أو تحرث الساحات جميعها وخصوصا الارض المجاورة لبيوت الطيور الداجنة وتحت الاشجار والمواقع الاخرى المظلمة التي تزورها الطيور في أغلب الاحيان. وهذا يساعد أشعة الشمس في تعقيم التربة المقلوبة حديثا لان التربة المضغوطة والقاسية لا تتمكن أشعة الشمس من اختراقها بصورة كافية . وبهذه الوساطة تهلك الطفيليات والامراض التي تعيش تحت سطح التربة.

وينبغي أن يلاحظ سلوك الطيور الذكرية في حظائر التربية ويلزم أن تنقل الطيور القليلة النشاط ويغير مكانها. ومن الوجهة الاخرى يقتضى أن تنقل لمدة قصيرة تلك الديوك الصغيرة الكثيرة الاعتداء والتي تقاتل الديوك الصغيرة الاخرى بدون انقطاع. ومن الضروري أن لا تحفظ ديوك صغيرة بكثرة مع الدجاج وينبغي أن يحفظ الزائد منها على حدة لحين الحاجة وتقطع الزوائد عن سيقان جميع الديوك الصغيرة وهذه الزوائد تشبه المناخس أو المهاميز وذلك حينما يربو عمرها على السنة الواحدة. وبهذا العمل يحسن خصب البيض الى حد كبير. وأفضل طريقة لاجراء ذلك هي بحرق هذه المناخس بحديد حام لدرجة الاحمرار ولا يعد هذا العمل جائرا لان هذه المناخس ليست حساسة ولا تشعر الديوك بألم عند كياها. ومما يؤلم الدجاجة أن يلحقها ديك كبير السن ذو منخاسين طويلين لانه قد يؤذيها.

وبما أن النهار يقصر تدريجيا والليل يطول بصورة مطابقة فيجب أن تشجع الطيور الداجنة بقدر الامكان على استهلاك الطعام خلال النهار. وبالإضافة الى المخلوطة الجافة ينبغي أن تطعم الطيور مخلوطة رطبة في منتصف النهار ويفضل أن تطعم في أحواض طعاما زائدا من الحب وخصوصا الذرة الافرنجية الصفراء وذلك في العلفة الاخيرة. وتستفيد الطيور كثيرا اذا نعتت الذرة الافرنجية في الماء مدة تتراوح ما بين الاربع وعشرين ساعة والست والثلاثين قبل اطعامها لها. وترجح الفراخ المفقسدة في الحريف وخصوصا في تشرين الثاني لان

الديوك الصغيرة تباع للاكل بسعر جيد في الربيع أما الفراخ فتبدأ في وضع البيض خلال الأشهر التي ترتفع فيها أسعار البيض وقد تشجع التربية المناسبة على عدم انقطاع وضع البيض حتى آخر خريف السنة المقبلة. وأحسن الأنسال للتلقيح لاجل التفقيس في تشرين الثاني هي—تلقح اللكهرون الابيض مع السوسكس الخفيف والروود آيلاند الاحمر مع السوسكس الخفيف واللكهرون الابيض مع الروود آيلاند الاحمر.

يعرف في مزارع كثيرة أن الدجاجات لا تكون ناجحة ولا بيضة رغم أنها تسكن وتطعم وتربي بصورة مرضية تماما. ومن المحتمل كثيرا أن مثل هذه الطيور تشكو من الديدان (أو مرض الكوكسيدوسيس المزمن). وفي مثل هذه الحالات ينبغي عدم ضياع الوقت في استعمال المعالجة الضرورية. ويعرف هذا المرض بوجود آثارات الدم في البراز ونحافة لحم الصدر (أو ضعفه) وارتخاء الاجنحة. والمعالجة هي : أن تعطى كل فرخة ثلاثة غرامات من الملح الانكليزي مرة في كل أسبوع وذلك لمدة ثلاثة أسابيع. وليضمن أن جميع الطيور قد حصلت على نصيبها مما ذكر يلزم أن يذاب الملح الانكليزي في قليل من الماء ويجدر أن يستعمل هذا للخلط مع كمية صغيرة من المخلوطة الرطبة التي لا تزيد عما تأكله الطيور في بضع دقائق. ويمكن أن تكتشف الديدان بشق طير أو اثنين من الطيور الشديدة المرض جدا والضعيفة مع قطع الامعاء بالطول. وحينئذ يلاحظ وجودها في الحال.

المعالجة

لقد نصح استعمال زيت البطم منذ عدة سنين (ويسمى زيت التربنتينا) كدواء طارد للدود وقد وجد أنه مؤثر جدا. وضرره الوحيد هو أنه يستلزم تناول الحاص لأنه اذا خلط مع المخلوطة يجعلها غير شهية فلا تأكلها الطيور. ويلزم أن يمنع الطعام عن الطيور حتى مساء اليوم السابق لاعطاء التربنتينا. وينبغي حينئذ أن توضع للطيور مخلوطة رطبة محتوية على ملح انكليزي بنسبة ملء ملعقة شاي واحدة لكل طير. وفي صباح اليوم التالي يوضع لكل طير ملء ملعقة شاي واحدة أو اثنين من زيت التربنتينا مخلوط مع كمية مساوية من زيت

الزيتون. ويجب أن يصب في حلق الطير أو يدخل في حوصلته بواسطة أنبوبة مطاط قوية موصولة في محقنة (أى حقنة) أو قمع زجاجى. وبعد المعالجة بثلاث ساعات أو أربع تطعم الطيور قليلا من المخلوطة الرطبة المحتوية على ملح انكليزى كما سلف ذكره ومن الضرورى أن تعاد المعالجة في خلال عشرة أيام. ويقتضى أن يطعم قطع الطيور علفة مغذية جيدة لكي تتحسن حالته. ويلزم أن تنقل الطيور بعد المعالجة لتنظيف الارض وتعقيم الساحات المتروكة للتخلص من الاشياء التى تكون واسطة لنقل المرض. وينبغى أن ينقل الزبل بعيدا جدا عن بيت الطيور.

الثلاثاء في ٢٨ أيلول سنة ١٩٣٧

حديث زراعى

مباحثة بين المستشار المتجول لمصلحة وقاية
النبات ومزارع خضار

سؤال :- أرجو أن تفيدنى عن المن وطرق مكافحة المن الذى يصيب الخضار

جواب :- ان هذه الحشرة تسبب ضررا كبيرا للخضار في بعض الاحيان وهى تظهر على الغالب عندما يكون الطقس رطبا وهى تصيب جميع أصناف الخضار وتكون خسارة الخضار المهمة عظيمة وقد لوحظ تخريب كلى في مزروعات الملفوف والبطيخ من جراء هذه الحشرة وبما أن المن يتسلط على الجذوع والاوراق لذلك تسهل روءيته. ان هذه الحشرة تضر الخضار بامتصاصها العصير من أجزاء النباتات الخضراء أى الطرية وتسبب موتها وتمتاز النباتات المصابة بتجعده الاوراق واصفرارها وتفضل هذه الحشرة الاوراق الداخلية في الملفوف. ويرغب المن عادة في أن يعيش على الوجه السفلى الاوراق ولهذا السبب تصعب مكافحته ، عندما يبدأ المن بالظهور تشاهده على قسم صغير من الخضار أو على بعض البيوت وهذا هو الوقت المناسب لمكافحة هذه الحشرة (أولا) تسهل مكافحة أية حشرة في بدء ظهورها أى قبل أن تنتشر على المزروعات (ثانيا) وتقل مصاريف المكافحة عندما تكون الحشرة محصورة على أشغال قليلة وقبل أن تصيب المزروعات جميعها ، ويكافح المن بتغيير الخضار المصابة بمسحوق يدعى (ديريمك) وكيفية استعمال هذا العلاج هى بوضعه في كيس صغير من الشاش الضبوط على أن تغير النباتات المصابة تغييرا جيدا ، وذلك عندما تلاحظ عليها وجود المن ، عليك أن تملأ نصف الكيس من هذا العلاج وتهز يدك فوق البيوت المراد تغييرها أو تخبط الكيس بعصى صغيرة . ومسحوق الديريمك يمكن ان يحصل عليه من بائعى الادوات الزراعة في البلاد.

سؤال :- هل يمكنك أن تفيدنى عن الصرصور الاحمر الذى يضر بالمقائى.

جواب :- ان هذا الصرصور الذى يسميه الزراع (الحمرة او البقيرى) والذى يخرب في بعض الاحيان مقائى الخيار والشمام ، يتولد من دودة لونها أصفر ضارب للخضرة ، وطريقة مكافحة هذه الآفة هى بمسحوق سليكات الباريوم ، وهذا العلاج يستعمل للتغير وليس للرش . فيجب أن تخلط هذا المسحوق مع بودرة أو طحين ناعم أو كبريت أصفر عوضا عن الماء فعليك اذا أن تخلط كيلو غراما واحدا من مسحوق الباريوم مع كيلو غرام واحد من البودرة أو الطحين أو الكبريت على أن تخلطهما جيدا قبل الاستعمال ويمكنك أن تغير المقتاية المصابة بواسطة ماكنة تغير أو كيس من الشاش كالسالف الذكر.

سؤال :- وما هى دودة البندورة وكيفية مكافحتها.

جواب :- تفقس هذه الدودة من بيض فراشة تضعه على أوراق البندورة ، ثم تبدأ هذه الديدان بأكل الاوراق ، وعندما تصبح الديدان بقدر نصف حجمها الطبيعي تثقب الحبة وتدخل فيها فتتغذى عليها. ويمكنك مكافحتها بواسطة التغير بمسحوق سليكات الباريوم ، وعليك ان تبدأ بالتغير عندما تلاحظ الديدان الصغيرة على الورق او حينما يكون حجم حبة البندورة بقدر حبة الجوز الصغيرة وذلك قبل أن تنضج ويقتضى أن تغير البندورة مرة ثانية بعد الاولى بمدة خمسة عشر يوما فعليك حينئذ أن تخلط كيلو غراما ونصف من سليكات الباريوم مع كيلو غرام واحد من مسحوق التراب الناعم أو الطحين الناعم على أن تخلط العلاج جيدا ثم تغير البيوت بنفس الطريقة التى مر ذكرها.

سؤال :- كيف تكافح الحشرة التى تسبب سقوط البندورة وتشققها.

جواب :- هل تعنى الحشرة الخضراء التى تشبه البقة الكبيرة. فهذه الحشرة أو البقة تتغذى بامتصاصها العصير من ثمرة البندورة فتسبب التشقق لها وفي بعض الاحيان تتغذى هذه البقة بامتصاصها العصير عند العنق فتضعف الحبة وتسبب سقوطها الى الارض وتقدر ان تكافح هذه الحشرة بمسحوق ديريمك بواسطة التغير وذلك حين ظهور الحشرة.

سؤال :- هل لك أن تفيدنى عن طريقة مكافحة البرغوث الصغير الذى يتلف مساكب القرنيط والملفوف.

جواب :- ان ضرر هذه الحشرة الرئيسى هو على المساكب وذلك حين انبات البذور ويتابع البرغوث ضرره حتى تبلغ الاوراق النمو التام ويزداد هذا الضرر في حالة الجفاف أو الصقيع حيث أن نباتات المساكب لا تنمو النمو السريع حتى تغلب على ذلك وقد يضطر المزارع بسبب ضرر هذه الحشرة أن يعيد زراعة المساكب مرات عديدة ويضر البرغوث أيضا بعد تشليلها وغرسها ويمكنك أن تزيل ضرر هذه الآفة بالتغير بمسحوق ديريمك ويجب أن تبدأ بالتغير عند ظهورها في المساكب وبعد ذلك ، تعيد عملية التغير في حالة وجود البرغوث.

سؤال :- ماذا تصنع بالدودة التي تأكل القرنييط والملفوف.

جواب :- هل تعنى الدودة التي تأكل الاوراق ؟. ان هذه الدودة تتولد من بيض فراشة بيضاء وهذه الفراشة تضع بيضها على أوراق الخضر وعند التفقيس تبقى الديدان مجتمعة مع بعضها فتتغذى من الاوراق وتسبب للمحصول تلفا كبيرا واذا لاحظتها جيدا حين ظهورها فلا تجد الا قليلا من البيوت مصابة فعليك حينئذ أن تغير البيت الذى تجد عليه الدود بمسحوق ديريمك ويجب أن تغير جيدا وجه الاوراق السفلى واذا وجدت بعض الدود بكمية صغيرة فيلزم أن تجمعها وتهلكه.

سؤال :- أرجو أن تعرفنى طريقة لمكافحة الدودة التي تأكل قلب الملفوف والقرنييط

جواب :- ان هذه الدودة الصغيرة تجدها في بعض الاحيان في المساكب واذا انتهت اليها يمكنك أن تتخلص منها بسهولة وذلك بتغير المساكب المصابة بمسحوق سليكات الباريوم على أن تخلط كيلو غراما ونصف من سليكات الباريوم مع كيلو غرام واحد من الغبار الناعم أو الطحين الناعم وحينما تلاحظها على الاشتال يلزم أن تتبع ذات الطريقة المذكورة.

سؤال :- نشاهد في بعض الاحيان دودة بنية اللون ضاربة الى الصفرة على ورق الباذنجان فما هى هذه الدودة وكيف نكافئها؟.

جواب :- ان هذه الدودة التي تأكل ورق الباذنجان هى نفس الدودة التي تثقب حب البندورة ويمكنك مكافئتها عند ظهورها بتغير الاشتال بمسحوق سليكات الباريوم. على أن

تخلط كيلو غراما ونصف من سليكات الباريوم مع كيلو غرام واحد من تراب ناعم أو طحين ناعم وتغبر البيوت المصابة تغيراً جيداً

وبخصوص التغير بوجه عام فمن الضروري أن لا تغبر النباتات المصابة الا في الصباح الباكر وقيل غروب الشمس وفي وقت ساكن الرياح.

سؤال : — كيف تكافح كلب الماء ؟.

جواب : — ان كلب الماء الذي يسميه بعض المزارعين الحلوش أو المالموش والذي يحفر خنادق تحت وجه التراب ويقطع جذور الخضر عند وجه الارض فيتلفها ويمكنك أن تتخلص منه بتسميمه بواسطة فسفات الزنك أو سليكات الباريوم فتضع تسعة كيلو غرامات نخالة خشنة في وعاء وترطبها بالماء وعندئذ تخلطها مع كيلو غرام واحد من فسفات الزنك وإذا أردت أن تستعمل العلاج الثاني فتضع ستة كيلو غرامات نخالة خشنة في وعاء وترطبها بالماء وبعدئذ تخلطها مع كيلو غرام واحد من سليكات الباريوم وعليك أن تخلط النخالة والسم جيداً ثم تبذر النخالة المسمومة في أتلالم الخضرة ويكون بذر الطعم بعد السقي وعند غروب الشمس. وهناك طريقة أخرى وهي أن تعجن جيداً مقدار أربع أواق طحين قمح أو ذرة مع وقية واحدة من سم سليكات الباريوم وتعمل من هذه العجينة حبوباً بحجم حبة الحمص ثم توزعها بين صفوف الاشغال وذلك بان تثقب التراب باصبعك أو بعود وتضع حبة واحدة من هذا المعجون في كل ثغرة على عمق خمسة سنتيمترات تقريباً ثم تطمرها. يجب أن تغسل الوعاء جيداً الذي جرى فيه خلط السم وذلك بالماء الغالي وليكن معلوماً أن الطيور التي تأكل من ذلك الطعم تتسمم لهذا يجدر بك أن تحفظ الطيور الداجنة بعيدة عن الحقل الذي وضع فيه الطعم.

سؤال : — ما هي الدودة التي تفرم شتل الملفوف وطريقة مكافحتها ؟.

جواب : — ان ضرر هذه الدودة متنوع ، ويوجد هذا الدود القارض في النهار تحت وجه التراب أو تحت الاوراق أو بين الاعشاب الكثيفة أو تحت الحجارة ويخرج هذا الدود

في الليل ويتغذى في بعض الاحيان على ورق النبات ويقرض غالبا ساق النبات على وجه التراب وفي داخله ويسبب حينئذ ضررا كبيرا ويشبه لونه عادة لون التراب الذي يعيش فيه لذلك تصعب رؤيته على المزارع ولا يلاحظ وجوده الا بعد أن يسبب تلفا كبيرا للنباتات واذا فحّصت زرعك أثناء الليل حيث تخرج هذه الديدان من مخبأها ساعية في طلب الغذاء تتمكنك رؤيتها. يمكنك أن تكافح هذه الآفة بواسطة سليكات الباريوم فتضع ستة كيلوغرامات نخالة خشنة في وعاء وترطبها جيدا بالماء ثم تخلطها مع كيلوغرام واحد من سليكات الباريوم وعندما تغرس الاشتال تضع النخالة المسمومة عند سيقانها وتغطيها بقليل من التراب واذا لم تفعل ذلك فيجدر بك حينما تلاحظ الإصابة في زرعك أن تبذر الطعم في الاتلام وذلك بعد الظهر وعند غروب الشمس ولا تنس أن تغسل الوعاء جيدا الذي جرى فيه خلط السم وذلك بالماء الغالي وليكن معلوما أن الطيور التي تأكل من ذلك الطعم تتسمم لهذا يجدر بك أن تحفظ الطيور الداجنة بعيدة عن الحقل الذي وضع فيه الطعم. وتمكنك مكافحة جميع أنواع الدود التي تأكل أوراق الخضر بالتعبير بمسحوق (درميك). أما هذه العلاجات كلها السالفة الذكر فيمكن الحصول عليها من السوق واذا لم تتمكن من الحصول على أى علاج ، يجب أن تطلب المساعدة من مصلحة وقاية النبات وهذه المصلحة تساعدك على الحصول على العلاج اللازم.

وأرغب في أن أذكر اليك مثلا ينطبق على حالة الفلاح في هذه البلاد وهو اذا مرض أحد أفراد عائلته ترا يدعو الله أن يشفي مريضه ، واذا أصيبت مزروعاته بأى مرض كان فانه يطلب من مصلحة وقاية النبات أن تعالج زرعته ، ولكنه لا يفكر في أن يستشير هذه المصلحة أو يعالج مزروعاته الا بعد أن يفوت الوقت أو يخسر كل محصوله وقد يرجع السبب الى عدم اهتمام المزارع باستشارة مصلحة وقاية النبات أو مكافحة الامراض الموجودة في حقله ومعالجة أى زرع لا تكلف أكثر من ثمن جزء من المحصول ، ورغم ذلك فلا يقوم المزارع بهذا العمل وليس هذا جبا في توفير المال بل لانه يتوقع من مصلحة وقاية النبات أن تقوم بذلك العمل. اذا رغب المزارع في أية نصيحة لوقاية محصوله من أى مرض كان فعليه أن يكتب الى رئيس مصلحة وقاية النبات في ادارة الزراعة ومصائد الاسماك (بالقدس)

أو الى مختبر مصلحة وقاية النبات (الدبوية عكا) أو الى مفتش النبات بادارة الزراعة في طبريا
أو الى المساعد الفنى لرئيس مصلحة وقاية النبات في ادارة الزراعة ومصائد الاسماك (بالقدس)
ويمكنه أن يحصل على النصائح اللازمة عند مقابلة الموظف المختص في احدى المناطق السالفة
الذكر وتقدم هذه النصائح الى المزارع مجانا وليعلم المزارع بان الموظفين المذكورين على أتم
الاستعداد لمساعدته وارشاده.
